

М.Т.Дженалиев¹, М.И.Рамазанов², А.К.Жанболова²

¹КР БФМ ФК Математика және математикалық модельдер институты, Алматы;

²Е.А.Бекетов атындағы Қараганды мемлекеттік университеті

(E-mail: ramatut@mail.ru)

Бірқалыпты қозғалмалы шекарасы бар жылуоткізгіштік теңдеуі үшін Вольтерра сингулярлы интегралдық теңдеуінің шешімі

Уақытта қозғалмалы шекаралы облыстардағы жылуоткізгіштік теңдеулерінің шеңтік есептері үлкен қолданбалы мәнге ие. Мысалы, кристалдардың өсуінің теориясына, мұнай қабаттарының термикасына, шогырыланған энергия ағымдарымен ыстық ету мәселесіне, жаңғыш материалдар қабатындағы жану процестеріне қатысты мәселелерді шешу қозғалмалы шекаралы есептерді шешуге әкеледі. Облыстың шекаралары еркін қозғалыс заңымен өзгеретін осындағы типті есептерді шешудің жалпы әдісі қарапайым және екі қабатты жылулық потенциалдар теориясына негізделеді, ол Вольтерр типті екінші текті интегралдық теңдеулерді шешудің қажеттігіне әкеледі.

Кілт сөздер: Вольтерра сингулярлы интегралдық теңдеуі, бірқалыпты қозғалмалы шекарасы бар жылуоткізгіштік теңдеуі, Лаплас түрлендіруі.

Бұл жұмыста шекарасы $x = t$ заңымен қозғалатын бір өлшемді жылулық есептің шешімі беріледі

$$G = \{(x, t) : t > 0, 0 < x < t\}$$

облысында

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (1)$$

жылуоткізгіштік теңдеуінің шешімін табу керек. Бұл теңдеу

$$u(x, t) |_{x=0} = v(t), u(x, t) |_{x=t} = w(t) \quad (2)$$

шекаралық шарттарын қанағаттандыруы қажет. Мұндағы $u(x, t)$

$$[\gamma(x, t)]^{-1} \cdot u(x, t) \in L_\infty(G),$$

$$\gamma = \max\left[\frac{\sqrt{t}}{t-x} \exp\left\{-\frac{x^2}{4a^2 t}\right\}; \exp\left\{\frac{t-x}{a^2}\right\}\right],$$

класына тиісті, $\gamma(x, t) \geq 1$, $\{x, t\} \in G$.

$v(t)$ және $w(t)$ функцияларын үзіліссіз деп есептейміз. Қажет болған жағдайда, $t = 0$ аумағында шешім үзіліссіз болуы үшін қосымша үйлесімдік $v(0) = w(0)$ шартын қолдануымыз керек.

Жылулық потенциалдар әдісін қолдана отырып, берілген есептің шешімін Вольтерра сингулярлы интегралдық теңдеуінің шешіміне әкелуге болады [1].

$$\varphi(t) - \int_0^t K(t, \tau) \varphi(\tau) d\tau = f(t), \quad (3)$$

мұндағы

$$K(t, \tau) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \left\{ \frac{t+\tau}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp\left(-\frac{(t+\tau)^2}{4a^2(t-\tau)}\right) + \frac{1}{(t-\tau)^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{t-\tau}{4a^2}\right) \right\}, \quad (4)$$

$$f(t) = -2a^2 \left[w(t) - \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{t}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp\left(-\frac{t^2}{4a^2(t-\tau)}\right) v(t) dt \right]. \quad (5)$$

$K(t, \tau)$ ядросы келесі қасиеттерге ие:

1) $K(t, \tau) \geq 0$ және $0 < \tau \leq t \leq 1$ аралығында үзіліссіз,

2) $\lim_{t \rightarrow t_0} \int_{t_0}^t K(t, \tau) d\tau = 0, t_0 \geq \varepsilon > 0;$

3) $\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^t K(t, \tau) d\tau = 1.$

1) және 2) қасиеттер орындалатындығы айқын. Енді 3) қасиеттің орындалатындығын көрсөтейік.

$$x = \sqrt{t - \tau}$$

ауыстыруын жасасақ, алатынымыз:

$$\begin{aligned} \int_0^t K(t, \tau) d\tau &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{\frac{2t}{a^2}} \int_0^{\sqrt{t}} \exp\left\{-\left(\frac{t}{ax} + \frac{x}{2a}\right)^2\right\} \left(\frac{t}{ax^2} - \frac{1}{2a}\right) dx + \\ &+ \frac{1}{a\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2}} dx = \|z = \frac{t}{ax} + \frac{x}{2a}; \xi = \frac{x}{2a}\| = e^{\frac{2t}{a^2}} \operatorname{erfc}\left(\frac{3\sqrt{t}}{2a}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{t}}{2a}\right), \end{aligned}$$

Мұндагы

$$\operatorname{erf}(\theta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\theta e^{-z^2} dz; \operatorname{erfc}(\theta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_\theta^\infty e^{-z^2} dz.$$

Яғни

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^t K(t, \tau) d\tau = 1,$$

сонымен қоса

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t K(t, \tau) d\tau = 1.$$

(3) теңдеудің шешімі [2–5]-те (4) ядроның сипаттамалық бөлігін бөліп алу арқылы және сипаттамалық теңдеудің шешімін регулиризациялау әдісі арқылы табылған. Мақалада біз теңдеудің шешімін Лаплас түрлендіруі әдісі арқылы іздестіреміз. Ол үшін

$$t + \tau = 2t - (t - \tau), \frac{(t + \tau)^2}{4a^2(t - \tau)} = \frac{t\tau}{a^2(t - \tau)} + \frac{t - \tau}{4a^2}$$

қатынастарын қолданып, (3) теңдеуді келесі түрде жазамыз:

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \int_0^t \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \left\{ \frac{2t}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp\left\{-\frac{t\tau}{a^2(t-\tau)}\right\} - \frac{1}{(t-\tau)^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{t\tau}{a^2(t-\tau)}\right\} + \frac{1}{(t-\tau)^{\frac{1}{2}}} \right\} \times \\ \times \exp\left\{-\frac{t-\tau}{4a^2}\right\} \varphi(\tau) d\tau = f(t). \end{aligned} \quad (6)$$

Келесі

$$\varphi_1(t) = \sqrt{t} e^{\frac{\tau}{4a^2}} \cdot \varphi(t) \quad (7)$$

ауыстырынан кейін (3) теңдеу

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \int_0^t \sqrt{\frac{t}{\tau}} \cdot \frac{t}{a\sqrt{\pi}(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \cdot \exp\left\{-\frac{t\tau}{a^2(t-\tau)}\right\} \cdot \varphi_1(\tau)d\tau + \\ &+ \int_0^t \sqrt{\frac{t}{\tau}} \cdot \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \left[1 - \exp\left\{-\frac{t\tau}{a^2(t-\tau)}\right\}\right] \cdot \varphi_1(\tau)d\tau \end{aligned} \quad (8)$$

түріне келеді. Осыдан кейін келесі ауыстырулар жасаймыз:

$$t = \frac{1}{t_1}; \tau = \frac{1}{\tau_1}; \varphi_1\left(\frac{1}{t_1}\right) = \psi(t_1). \quad (9)$$

Сонда теңдеуіміз келесі түрде жазылады:

$$\begin{aligned} \psi(t_1) &= \int_{t_1}^{\infty} \frac{1}{a\sqrt{\pi}(\tau_1-t_1)^{\frac{3}{2}}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{a^2(\tau_1-t_1)}\right\} \cdot \psi(\tau_1)d\tau_1 + \\ &+ \int_{t_1}^{\infty} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(\tau_1-t_1)}} \cdot \left[1 - \exp\left\{-\frac{1}{a^2(\tau_1-t_1)}\right\}\right] \cdot \frac{1}{\tau_1} \psi(\tau_1)d\tau_1. \end{aligned} \quad (10)$$

Лаплас турлендіруін қолданамыз [6]

$$\widehat{\psi}(p) = e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}} \cdot \widehat{\psi}(p) + \frac{1}{2a\sqrt{-p}} \left[1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}\right] \cdot \int_0^p \widehat{\psi}(q)dq + \widehat{F}_1(p). \quad (11)$$

Енді $\int_0^p \widehat{\psi}(q)dq = \Psi(p)$ белгілеуін енгізсек, яғни $\psi(p) = \frac{d\Psi(p)}{dp}$, онда алатынымыз

$$\left[1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}\right] \frac{d\Psi(p)}{dp} - \left[1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}\right] \cdot \frac{1}{2a\sqrt{-p}} \cdot \Psi(p) = \widehat{F}_1(p);$$

$$\frac{d\Psi(p)}{dp} - \frac{1}{2a\sqrt{-p}} \Psi(p) = \frac{1}{1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}} \cdot \widehat{F}_1(p)$$

немесе

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi(p)}{dp} - \frac{1}{2a\sqrt{-p}} \Psi(p) &= \widehat{F}_1(p) + \frac{e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}}{1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-p}}} \cdot \widehat{F}_1(p), \\ \Psi(p) &= e^{-\frac{\sqrt{-p}}{a}} \left[C + \int_0^p \frac{e^{-\frac{\sqrt{-q}}{a}}}{1 - e^{-\frac{2}{a}\sqrt{-q}}} \widehat{F}_1(q)dq\right]. \end{aligned} \quad (12)$$

Біртекті интегралдық теңдеудің шешімін табамыз, яғни

$$f(t) = 0.$$

$$\widehat{\Psi}(p) = C \cdot e^{-\frac{\sqrt{-p}}{a}} (c=const),$$

$$\widehat{\psi(p)} = \widehat{\Psi}'(p) = -C \cdot \frac{1}{2a\sqrt{-p}} e^{-\frac{\sqrt{-p}}{a}}.$$

Енді функцияның түпнұсқасын табамыз [7]

$$g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1}{\sqrt{p}} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{q}} J_1(2\sqrt{q \cdot p}) \widehat{g}(q) dq,$$

мұндағы $g(t) = \widehat{g}(q)$; $J_1(z)$ — Бессель функциясы.

$$\widehat{\varphi}_1(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{q}} \cdot J_1(2\sqrt{qp}) \cdot \frac{1}{2a\sqrt{q}} \cdot e^{-\frac{\sqrt{q}}{a}} dq =$$

$$= \|\sqrt{q} = \frac{\xi}{2\sqrt{p}}\| = \frac{1}{a\sqrt{p}} \int_0^\infty \frac{1}{\xi} \cdot J_1(\xi) e^{-\frac{2a\sqrt{p}}{\xi}} d\xi = F\left(\frac{1}{2}; 1; 2, -4a^2p\right),$$

мұндағы F — гипергеометриялық функция. Біздің жағдайымызда F гипергеометриялық функцияның қасиеті бойынша [8]

$$F\left(\frac{1}{2}; 1; 2, -4a^2p\right) = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - 4a^2p}}.$$

Бұл бейненің түпнұсқасы келесіге тең:

$$\sqrt{\pi} \left[-\frac{1}{a} e^{-\frac{t}{4a^2}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{2a} e^{\frac{t}{4a^2}} \cdot erfc\left(-\frac{\sqrt{t}}{2a}\right) \right\} \right] =$$

$$= -\frac{1}{a} \left[\frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{t}{4a^2}} + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \cdot erfc\left(-\frac{\sqrt{t}}{2a}\right) \right].$$

Осылайша, алғашқы біртекті (3) интегралдық теңдеудің жалпы шешімі келесі турде болады:

$$\varphi_0(t) = C \left\{ \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{t}{4a^2}} + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} erf\left(\frac{\sqrt{t}}{2a}\right) + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \right\}. \quad (13)$$

(1)–(2) біртекті шеттік есептің шешімі келесі турде болатындығын көрсете аламыз:

$$u(x, t) = C \cdot \int_0^t \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \left\{ \frac{x+t}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp\left[-\frac{(x+t)^2}{4a^2(t-\tau)}\right] + \frac{x-\tau}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \cdot \exp\left[-\frac{(x-t)^2}{4a^2(t-\tau)}\right] \right\} \varphi_0(\tau) d\tau,$$

мұндағы $\varphi_0(t)$ (13) қатынасынан табылады.

Сонымен,

$$u_t(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = \lambda u(x, t);$$

$$\{x, t\} \in G = \{t > 0, 0 < x < t\};$$

$$u(x, t)|_{x=0} = 0, t > 0;$$

$$u(x, t)|_{x=t} = 0, t > 0$$

спектрлі есебі үшін біз келесі теоремалар орындалатындығын дәлелдедік.

Теорема 1. Берілген спектрлі есептің $\lambda_0 = 0$ меншікті мәні және $u_{hot}(x, t)$ меншікті функциясы бар, сонымен қоса

$$[\gamma(x, t)]^{-1} \cdot u_{hot}(x, t) \in L_\infty(G), \gamma(x, t) \geq 1,$$

$$\gamma = \max \left[\frac{\sqrt{t}}{t-x} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2 t} \right\}; \exp \left\{ \frac{t-x}{a^2} \right\} \right].$$

Теорема 2. Жалғыздық класы:

$$[\gamma_\varepsilon(x, t)]^{-1} \cdot u(x, t) \in L_\infty(G), \gamma_\varepsilon(x, t) \geq 1,$$

мұндагы

$$\gamma_\varepsilon = \max \left[\left(\frac{\sqrt{t}}{t-x} \right)^{1-\varepsilon} \cdot \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2 t} \right\}; \exp \left\{ \frac{(1-\varepsilon)(t-x)}{a^2} \right\} \right], \varepsilon > 0.$$

Алгаашқы шеттік есептің шешімі

Енді біз $G = \{(x, t) : t > 0, 0 < x < t\}$ облысында

$$u(x, t)|_{x=0} = v(t), u(x, t)|_{x=t} = w(t)$$

шекаралық шарттарын қанагаттандыратын

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

жылуоткізгіштік теңдеуінің шешімін табуымыз қажет. Шешімді айқын түрде жазайық. $v(t)$ және $w(t)$ шарттанын қолданып, (1)–(2) бірінші шеттік есептің шешімін айқын түрде көрсетейік:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \nu(\tau) d\tau + \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x-\tau}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left\{ -\frac{(x-\tau)^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \varphi(\tau) d\tau, \end{aligned} \quad (14)$$

мұндагы

$$\nu(t) = 2a^2 v(t) + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\tau}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left\{ -\frac{\tau^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \varphi(\tau) d\tau. \quad (15)$$

(14) мәнін (15) теңдеуге қоямыз

$$u(x, t) = \frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \cdot v(\tau) d\tau + J_1(x, t) + J_2(x, t),$$

мұндагы

$$J_2(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x-\tau}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} \exp \left\{ -\frac{(x-\tau)^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \varphi(\tau) d\tau.$$

$J_1(x, t)$ есептейік:

$$\begin{aligned}
 J_1(x, t) &= \frac{1}{(2a\sqrt{\pi})^2} \int_0^t \frac{x}{(t-\tau)^{3/2}} \cdot \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} \times \\
 &\quad \times \left[\int_0^\tau \frac{\tau_1}{(\tau-\tau_1)^{3/2}} \exp \left\{ -\frac{\tau_1^2}{4a^2(\tau-\tau_1)} \right\} \cdot \varphi(\tau_1) d\tau_1 \right] d\tau = \\
 &= \frac{1}{(2a\sqrt{\pi})^2} \int_0^t \varphi(\tau_1) d\tau_1 \cdot \int_{\tau_1}^t \frac{x\tau_1}{[(t-\tau)(\tau-\tau_1)]^{3/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{4a^2} \left[\frac{x^2}{t-\tau} + \frac{\tau_1^2}{\tau-\tau_1} \right] \right\} d\tau = \\
 &= \|\sqrt{\frac{t-\tau}{\tau-\tau_1}} = z\| = \frac{1}{(2a\sqrt{\pi})^2} \int_0^t \varphi(\tau_1) \left\{ e^{-\frac{x^2+\tau_1^2}{4a^2(t-\tau_1)}} \right\} d\tau_1 \int_0^\infty \frac{2x\tau_1}{(t-\tau_1)^2} \left(1 + \frac{1}{z^2} \right) \times \\
 &\quad \times \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2(t-\tau_1)} \cdot \frac{1}{z^2} - \frac{\tau_1^2}{4a^2(t-\tau_1)} \cdot z^2 \right\} d\tau = \\
 &= \frac{1}{(2a\sqrt{\pi})^2} \int_0^t \varphi(\tau_1) \frac{2x\tau_1}{(t-\tau_1)^2} \left\{ \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{2a\sqrt{t-\tau_1}}{\tau_1} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{2a\sqrt{t-\tau_1}}{x} \right\} \times \\
 &\quad \times \exp \left\{ -2 \frac{x\tau_1}{4a^2(t-\tau_1)} - \frac{x^2 + \tau_1^2}{4a^2(t-\tau_1)} \right\} d\tau_1 = \\
 &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x+\tau_1}{(t-\tau_1)^{3/2}} \exp \left\{ -\frac{(x+\tau_1)^2}{4a^2(t-\tau_1)} \right\} \varphi(\tau_1) d\tau_1.
 \end{aligned}$$

Осылайша, (1), (2) тендеудің шешімі келесі түрде болады:

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{x}{(t-\tau)^{3/2}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} v(\tau) d\tau + \\
 &+ \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \left\{ \frac{x+\tau}{(t-\tau)^{3/2}} e^{-\frac{(x+\tau)^2}{4a^2(t-\tau)}} + \frac{x-\tau}{(t-\tau)^{3/2}} e^{-\frac{(x-\tau)^2}{4a^2(t-\tau)}} \right\} \varphi(\tau) d\tau,
 \end{aligned}$$

Мұндағы

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) &= f(t) + \int_0^t R(t, \tau) \exp \left\{ -\frac{t-\tau}{4a^2} \right\} f(\tau) d\tau + C \left\{ \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{t}{4a^2}} + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \operatorname{erf} \left(\frac{\sqrt{t}}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \right\}, \\
 f(t) &= -2a^2 \left[w(t) - \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{t}{(t-\tau)^{3/2}} \exp \left\{ -\frac{t^2}{4a^2(t-\tau)} \right\} v(\tau) d\tau \right],
 \end{aligned}$$

ал

$$R(t, \tau) = \frac{t}{a\sqrt{\pi}(t-\tau)^{3/2}} \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \exp \left\{ -\frac{n^2 t \tau}{a^2(t-\tau)} \right\} + \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2a^2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a\sqrt{\pi}}{\sqrt{t-\tau}} \exp \left\{ -\frac{n^2\tau t}{a^2(t-\tau)} \right\} + \pi n \cdot \exp \left\{ -\frac{\tau n^2}{a^2} \right\} \operatorname{erfc} \left(\frac{n\tau}{a\sqrt{t-\tau}} \right) \right) + \\
& + \frac{\sqrt{\pi}}{2a} \exp \left(\frac{t-\tau}{4a^2} \right) \left\{ 1 + \operatorname{erf} \left(\frac{\sqrt{t-\tau}}{2a} \right) \right\} + \\
& + \int_{\tau}^t \left\{ \frac{\tau_1}{2a^2(\tau_1 - \tau)^{3/2}} \exp \left(\frac{t-\tau_1}{4a^2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \exp \left\{ -\frac{n^2\tau_1\tau}{a^2(\tau_1 - \tau)} \right\} + \right. \\
& + \frac{1}{4a^2\sqrt{\tau_1 - \tau}} \exp \left(\frac{t-\tau_1}{4a^2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{n^2\tau_1\tau}{a^2(\tau_1 - \tau)} \right\} + \\
& \left. + \frac{\sqrt{\pi}}{4a^3} \exp \left(\frac{t-\tau_1}{4a^2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \exp \left\{ -\frac{\tau n^2}{a^2} \right\} \operatorname{erfc} \left(\frac{n\tau}{a\sqrt{\tau_1 - \tau}} \right) \right\} d\tau_1.
\end{aligned}$$

Әдебиеттер тізімі

- 1 *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1990. — 724 с.
- 2 *Dzenaliyev M.T., Kalantarov V.K., Kosmakova M.T., Ramazanov M.I.* On the second boundary value problem for the equation of heat conduction in an unbounded plane angle // Bull. of Karaganda University. Ser. Mathematics. — 2014. — No. 4 (76). — P. 47–56.
- 3 *Jenaliyev M.T., Amangaliyeva M.M., Kosmakova M.T.* On a Volterra equation of the second kind with ‘incompressible’ kernel // Journal calculated. Mat. and Math. Physics. — 1978. — Vol. 18. — No. 6. — P. 1139–1145.
- 4 *Амангалиева М.М., Дженалиев М.Т., Космакова М.Т., Рамазанов М.И.* О задаче Дирихле для уравнения теплопроводности в бесконечной угловой области // Докл. Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. — 2013. — Т. 15. — № 2. — С. 9–24.
- 5 *Amangaliyeva M.M., Dzenaliyev M.T., Kosmakova M.T.* On one homogeneous problem for the heat equation in an infinite angular domain // Siberian Mathematical Journal. — 2015. — Vol. 56. — No. 6. — P. 982–995.
- 6 *Диткин В.А., Прудников А.П.* Операционные исчисления. — М.: ВИНИТИ, 1966.
- 7 *Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.* Интегральные уравнения. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 192 с.
- 8 *Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И.* Интегралы и ряды. — Т. 2. — М.: Физматлит, 2003. — 664 с.

М.Т.Дженалиев, М.И.Рамазанов, А.К.Жанболова

К решению сингулярного интегрального уравнения Вольтерра тепловой задачи с равномерно движущейся границей

Краевые задачи уравнения теплопроводности в областях с движущимися во времени границами приобретают большое практическое значение. Так, например, решение вопросов, связанных с теорией роста кристаллов, термикой нефтяных пластов, проблемой теплового удара концентрированными потоками энергии, с процессами горения в слое горючего материала, сводится к решению задач с движущейся границей. Общий метод решения подобного рода задач при произвольном законе движения границ областей основан на теории тепловых потенциалов простого и двойного слоя, который приводит к необходимости решения интегральных уравнений типа Вольтерры второго рода. В данной работе рассмотрено сингулярное интегральное уравнение типа Вольтерры с движущейся границей.

М.Т. Jenaliyev, M.I.Ramazanov, A.K.Zhanbolova

The solution of the singular Volterra integral equation of the thermal problem with a uniformly moving boundary

Boundary value problems the heat equation in domains with moving through time boundaries are becoming of great practical importance. For example, the addressing: with the theory of crystal growth, thermal oil reservoir, the problem of heat stroke by the concentrated streams of energy, the combustion layer of combustible material is reduced to the solution of problems with moving boundary. A General method of solving such kind of problems by the arbitrary law of motion of region bounds based on the theory of heat potentials simple and double layers, which leads to the solution of integral equations of type Volterra of the second kind.

References

- 1 Tikhonov A.N., Samarskyi A.A. *Equations of mathematical physics*, Moscow: Nauka, 1990, 724 p.
- 2 Dzhenaliyev M.T., Kalantarov V.K., Kosmakova M.T., Ramazanov M.I. *Bull. of the Karaganda University*, Ser. Mathematics, 2014, 4 (76), p. 47–56
- 3 Jenaliyev M.T., Amangaliyeva M.M., Kosmakova M.T. *Journal calculated. Mat. and Math. Physics*, 1978, 18, 6, p. 1139–1145.
- 4 Amangalieva M.M., Jenaliyev M.T., Kosmakova M.T., Ramazanov M.I. *Reports Adyghe Circassian, International Academy of Sciences*, 2013, 15, 2, p. 9–24.
- 5 Amangalieva M.M., Dzhenaliev M.T., Kosmakova M.T. *Siberian Mathematical Journal*, 2015, 56, 6, p. 982–995.
- 6 Ditkin V.A., Prudnikov A.P. *Operational calculus*, Moscow: VINITI, 1966.
- 7 Krasnov M.L., Kiselev A.I., Makarenko G.I. *Integral Equations*, Moscow: Editorial URSS, 2003, 192 p.
- 8 Prudnikov A.P., Brychkov Yu.A., Marichev O.I. *Integrals and Series*, 2, Moscow: Fizmatlit, 2003, 664 p.